

**ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ' ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2008
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΘΕΜΑ 1°

- A.** 1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 91
2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 188
- B.** 1. Λ, 2. Λ, 3. Σ, 4. Σ

ΘΕΜΑ 2°

A. Ο $z_2 = \bar{z}_1 = 1 - i$, είναι η άλλη ρίζα της εξίσωσης

$$\text{Τύποι Vieta} \begin{cases} S = z_1 + z_2 = -\frac{\lambda}{3} \\ P = z_1 \cdot z_2 = \frac{\mu}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = -\frac{\lambda}{3} \\ 2 = \frac{\mu}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = -6 \\ \mu = 6 \end{cases}$$

B. α. $z_1^2 + z_2^2 = (1+i)^2 + (1-i)^2 = 1+2i-1+1-2i-1 = 0$

β. $z_1^{2008} + z_2^{2008} = (z_1^2)^{1004} + (z_2^2)^{1004} = (2i)^{1004} + (-2i)^{1004}$
 $= 2^{1004} \cdot i^{1004} + 2^{1004} \cdot i^{1004} = 2^{1004} + 2^{1004} = 2 \cdot 2^{1004} = 2^{1005}$

ΘΕΜΑ 3°

A. α. $\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1-x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)^2 = 0 \\ f(1) = 1-1 = 0 \end{array} \right\} \text{ άρα η } f \text{ είναι συνεχής στο } x_0 = 1$

β. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-x-0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-(x-1)}{x-1} = -1$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)^2 - 0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$

Είναι $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x-1}$,

άρα η f δεν είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$

B. Για $x > 1$ είναι $f'(x) = [(x-1)^2]' = 2(x-1)$

$f'(2) = 2 \cdot (2-1) = 2$

(ε) : $y - f(2) = f'(2) \cdot (x-2) \Leftrightarrow y - 1 = 2(x-2) \Leftrightarrow y = 2x - 3$

ΘΕΜΑ 4°

A. Πρέπει $x \neq 0$, άρα $D_f = \mathbb{R}^*$

B. Είναι $f(x) = \frac{x^2 + 2x + k}{x} = \frac{x^2}{x} + \frac{2x}{x} + \frac{k}{x} = x + 2 + \frac{k}{x}$

$$f'(x) = \left(x + 2 + \frac{k}{x} \right)' = 1 - \frac{k}{x^2}$$

Η εφαπτομένη της C_f στο $M(1, f(1))$ είναι παράλληλη στον $x'x$,
άρα $f'(1) = 0 \Leftrightarrow 1 - k = 0 \Leftrightarrow k = 1$.

Γ. Για $k = 1$ είναι $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x}$ και $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

α. • $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 2x + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(x^2 + 2x + 1) \frac{1}{x} \right] = -\infty,$

διότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 2x + 1) = 1$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = -\infty.$

Άρα έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την $x = 0$ ($y'y$).

• $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{x^2 + 2x + 1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 = \lambda$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - \lambda x] &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 2x + 1 - x^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x} = 2 = \beta. \end{aligned}$$

Άρα έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $-\infty$ την $(\epsilon): y = x + 2$.

• Όμοια έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την $(\epsilon): y = x + 2$.

β. $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

Για $x > 1$ είναι $x^2 > 1$, άρα $f'(x) > 0$.

Η f είναι συνεχής στο $[1, +\infty)$,

επομένως η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[1, +\infty)$.